

DEFENSA PÚBLICA DE TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER

Título: Tabaquismo y dentición no funcional en población de 15 años y más. Chile, ENS 2016-2017.

RESUMEN

Introducción: El tabaquismo corresponde a la adicción a la nicotina del tabaco. Según la evidencia científica mundial es la principal causa prevenible de enfermedad y su prevalencia corresponde al 20,7%. Este porcentaje varía ampliamente entre los países de la región de América, siendo mayor en Chile. El tabaco influye negativamente en la salud bucal, asimismo se ha reportado una asociación en el número de dientes perdidos con el tabaquismo, enfatizando que sujetos fumadores tienen menor cantidad de dientes que los individuos que no fuman.

Objetivos Determinar la asociación entre tabaquismo y la presencia de dentición no funcional en población entre 15 años y más en Chile, años 2016-2017.

Metodología: Corresponde a un diseño observacional transversal analítico, con datos secundarios. La población de estudio son personas de 15 años y más, chilenas o extranjeras que residen en Chile que participaron en la encuesta nacional de salud año 2016-2017. Para las variables de estudio, se calcularon frecuencias absolutas, porcentajes e intervalos de confianza de un 95%, para medir la relación entre las variables se realizó un análisis de contraste de hipótesis a través de la prueba estadística chi cuadrado y para medir la asociación un análisis de regresión logística multivariado.

Resultados: La prevalencia de presentar dentición no funcional es 1,069 veces mayor en personas que fuman respecto a los que no lo hacen. Asimismo, este se incrementa a medida que aumenta la edad, al igual que en la medida que disminuyen los años de estudios. Finalmente, el vivir en zona urbana es un factor protector al igual que el ser hombre.

Conclusión: El tabaquismo tiene implicancias negativas en la salud bucal que aumentan la posibilidad de pérdida de dientes. Los hallazgos de este estudio sugieren que existe una asociación entre el tabaquismo y la presencia de dentición no funcional. La educación, la prevención del tabaquismo y el mejor acceso a la salud bucal tanto en zonas urbanas como rurales, deben ser las estrategias para reducir la prevalencia de pérdida dentaria y por ende lograr una dentición funcional en nuestra población.

Palabras claves: tabaquismo, perdida de dientes, dentición no funcional.