

DEFENSA PÚBLICA DE TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER

FERNANDO MORENO LÓPEZ

Título: “Indicaciones de cesárea en Hospital San José de Victoria, año 2018”.

RESUMEN

Antecedentes: El aumento sostenido de las tasas de cesárea a nivel mundial se ha transformado en un problema de salud pública. Chile tiene una de las tasas de cesárea más altas de Latinoamérica y el Hospital San José de Victoria no escapa a esa realidad. La Clasificación de Robson permite estandarizar, evaluar, monitorear y manejar las tasas de cesáreas dentro de los centros de salud, para así racionalizar este recurso.

Objetivo: Determinar las principales indicaciones de operación cesárea en las pacientes que tuvieron parto institucional en el Hospital San José de Victoria durante el año 2018.

Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal, que incluye todas las mujeres embarazadas que tuvieron un parto institucional en el Hospital San José de Victoria entre el 01 de enero del 2018 y el 31 de Diciembre de 2018, con una edad gestacional mayor o igual a 22+0 semanas, clasificándolas según los 10 grupos de Robson, calculando proporción de cesáreas según grupo y según patología o condición clínica, además de la proporción de cesáreas para el período. Se utilizó estadística descriptiva para el análisis de datos.

Resultados: Hubo 864 partos institucionales, con una proporción de cesáreas de 42.5%. La proporción de cesáreas en las nulíparas fue de un 36.5%, mientras que en las multíparas fue de un 46.4%. Los grupos de Robson con una mayor contribución relativa al total de cesáreas fueron el 5 (multíparas término con cicatriz de cesárea) con un 39.5%, y el 2 (nulíparas con inducción de parto o cesárea electiva) con un 15.5%. El grupo 2 de Robson presenta una proporción de cesáreas de 69.5%. Las principales indicaciones de cesárea se dieron por una o más cicatrices de cesárea (32.7%) y por distocias del trabajo de parto (19.8%).

Conclusión: El Hospital de Victoria tiene una proporción de cesáreas mayor a lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud. Los grupos de Robson que presentaron una mayor proporción de cesáreas a lo sugerido son los que incluyen a las nulíparas de término, las inducciones de parto y las pacientes con cicatriz de cesárea anterior. En estos grupos se debieran centrar los esfuerzos por disminuir la tasa de esta intervención quirúrgica.

Palabras claves: cesárea, Clasificación Robson, tasa de cesárea, indicaciones de cesárea.